

# Wann sollte die zweite Boosterung erfolgen?

---

Bei vielen Menschen liegt die Auffrischungsimpfung schon länger zurück, zum Beispiel bei Menschen, die in Pflegeeinrichtungen leben und dem dort tätigen Personal. Die STIKO empfiehlt daher eine zweite Auffrischungsimpfung mit den bisherigen mRNA-Impfstoffen – von BioNTech oder Moderna – für bestimmte Personengruppen:

- **Besonders gefährdete Personen** – dazu zählen alle ab 60 Jahren sowie Menschen, die in Pflegeeinrichtungen wohnen oder betreut werden, Risikogruppen der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen und Menschen mit Immunschwäche. Sie sollen frühestens drei Monate ab der ersten Auffrischungsimpfung eine zweite Auffrischungsimpfung bekommen.
- Außerdem wird Personen, die in **medizinischen Einrichtungen oder in der Pflege** arbeiten – insbesondere, wenn Sie direkten Kontakt mit den ihnen anvertrauten gefährdeten Menschen haben – ebenfalls ein zweiter Booster empfohlen, und zwar frühestens sechs Monate nach der ersten Auffrischungsimpfung. In begründeten Einzelfällen kann aber auch bei dieser Gruppe die zweite Auffrischungsimpfung bereits nach frühestens drei Monaten erwogen werden.
- Menschen (älter ab 5 Jahren) mit einem erhöhten Risiko für schwere COVID-19-Verläufe infolge einer Grunderkrankung.

Quelle: <https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/corona-informationen-impfung/coronavirus-impfung-faq-1788988>